

PAKKAUSSELOSTE

1. Eläinlääkkeen nimi

Stromease 25 mg/ml silmätipat, liuos koiralle ja kissalle

2. Koostumus

Yksi ml sisältää:

Vaikuttavat aineet:

Asetyylikysteini	25,00 mg
------------------	----------

Apuaineet:

Ditiotreitoli	4,00 mg
---------------	---------

Dinatriumedetaatti	0,50 mg
--------------------	---------

Bentsalkoniumkloridi	0,10 mg
----------------------	---------

Väritön, lähes täysin kirkas liuos, jossa ei ole lähes lainkaan hiukkasia.

3. Kohde-eläinlaji(t)

Koira ja kissa



4. Käyttöaiheet

Sarveiskalvon haavaumien tukihoito.

5. Vasta-aiheet

Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä vaikuttavalle aineelle tai apuaineille.

6. Erityisvaroitukset

Erityiset varotoimet, jotka liittyvät turvalliseen käyttöön kohde-eläinlajeilla:

Hoidon aikana silmät täytyy tarkastaa säännöllisesti uudelleen.

Sarveiskalvon haavaumien hyvä hoito edellyttää taustasyyn ja/tai komplisoivien tekijöiden tunnistamista ja oikeaa hoitoa.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkettä eläimille antavan henkilön on noudatettava:

Pese kädet käytön jälkeen.

Tiineys ja laktatio:

Eläinlääkkeen turvallisuutta tiineyden ja laktation aikana ei ole selvitetty. Laboratoriokokeista rotilla ja kaneilla ei ole saatu näyttöä myrkyllisistä vaikutuksista tiineille naaraille.

Voidaan käyttää ainoastaan hoitavan eläinlääkärin hyöty-riskiarvion perusteella.

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset:

Ei tunneta.

Yliannostus:
Ei tunneta.

7. Haittatapahtumat

Koira ja kissa:

Hyvin harvinainen (< 1 eläin 10 000 hoidetusta eläimestä, yksittäiset ilmoitukset mukaan luettuina):
Antopaikassa todettavat reaktiot¹
Silmien ärsytys², silmätulehdus² (räpyttely, sulkeutunut silmäluomi, silmän punoitus, sidekalvoturvotus)³

¹ lievä ja lyhytaikainen, tarkoittaa epämukavuutta silmässä silmätippojen antamisen jälkeen

² ja/tai sen sivuelimien

³ etenkin koirilla

Haittatapahtumista ilmoittaminen on tärkeää. Se mahdollistaa eläinlääkkeen turvallisuuden jatkuvan seurannan. Jos havaitset haittavaikutuksia, myös sellaisia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai olet sitä mieltä, että lääke ei ole tehonnut, ilmoita ensisijaisesti asiasta eläinlääkärillesi. Voit ilmoittaa kaikista haittavaikutuksista myös myyntiluvan haltijalle tai sen paikalliselle edustajalle käyttämällä tämän pakkausselosteen lopussa olevia yhteystietoja tai kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta:

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

www-sivusto: <https://www.fimea.fi/elainlaakkeet/>

8. Annostus, antoreitit ja antotavat kohde-eläinlajeittain


Silmän pinnalle.

Tätä eläinlääkettä annetaan hoidettavaan silmään tai hoidettaviin silmiin kaksi tippaa 3–4 kertaa päivässä.

9. Annostusohjeet

Ohjeet pullon avaamiseen ja tiputtimen liittämiseen:

- Pese kädet huolellisesti, jotta lääkepullon sisältöön ei pääse mikrobiologisia epäpuhtauksia.
- Taita metallikorkki auki ja vedä se kokonaan alas valmiiksi leikattuja viivoja pitkin. Irrota sitten loput metallisinetistä (kuva 1).
- Irrota lääkepullosta oranssi tulppa (kuva 2).
- Älä koske lääkepullon suuhun tulpan avaamisen jälkeen.
- Ota tiputin, jonka päällä on pieni valkoinen kierrekorkki, sen pussista koskettamatta lääkepulloon kiinnitettävää päätä ja kiinnitä tiputin lääkepulloon (kuva 3), minkä jälkeen sitä ei enää irroteta.
- Eläinlääke on nyt käyttövalmis (kuva 4).



Käyttöohje:

Aloita eläinlääkkeen antaminen avaamalla pieni valkoinen kierrekorkki. Pidä koiran tai kissan päätä paikallaan hieman yläviistossa. Pidä pulloa pystysuorassa koskettamatta silmää. Laske käsi tai pikkusormi koiran tai kissan otsalle, jotta pullon ja silmän välinen etäisyys säilyy. Vedä hoidettavan silmän luomea varovasti alaspäin, niin että silmäluomi muodostaa pienen pussin. Purista varovasti tiputtimesta kaksi tippaa silmäluomen pussiin. Varo koskettamasta tiputtimen kärkeä pullon avaamisen jälkeen ja sulje valkoinen korkki käytön jälkeen. Pane pullo takaisin pakkaukseen pystyasentoon ja säilytä se poissa lasten näkyviltä ja ulottuvilta seuraavaan lääkkeenantoon asti.

Hoitoa jatketaan hoitavan eläinlääkärin ohjeiden mukaan.

Kun hoitoon kuuluu myös muita silmätuotteita, hoitojen antamisen välillä täytyy olla vähintään 5–10 minuuttia. Jos hoitoon kuuluu myös ei-vesipitoisia öljyisiä silmätuotteita, asetyylikytsteiinisilmätipat annetaan ensin.

10. Varoajat

Ei oleellinen.

11. Säilytystä koskevat erityiset varotoimet

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

Ei erityisiä säilytysohjeita.

Älä käytä tätä eläinlääkettä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen, joka on ilmoitettu etiketissä merkinnän Exp. jälkeen. Viimeisellä käyttöpäivämäärällä tarkoitetaan kuukauden viimeistä päivää. Sisäpakkauksen ensimmäisen avaamisen jälkeinen kesto aika: 7 vuorokautta.

12. Erityiset varotoimet hävittämiselle

Lääkkeitä ei saa kaataa viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana.

Eläinlääkkeiden tai niiden käytöstä syntyvien jättemateriaalien hävittämisessä käytetään paikallisia palauttamisjärjestelyjä sekä kyseessä olevaan eläinlääkkeeseen sovellettavia kansallisia keräysjärjestelmiä. Näiden toimenpiteiden avulla voidaan suojella ympäristöä.

Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä eläinlääkäriltäsi tai apteekista.

13. Eläinlääkkeiden luokittelu

Eläinlääkemääräys.

14. Myyntiluvan numero(t) ja pakkauskoot

Myyntiluvan numero:

38222

Pakkauskoot:

Pahvilaatikossa 5 ml:n pullo tiputtimella.

15. Päivämäärä, jolloin pakkausselostetta on viimeksi tarkistettu

06.10.2025

Tätä eläinlääkettä koskevaa yksityiskohtaista tietoa on saatavilla unionin valmistetietokannassa (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Yhteystiedot

Myyntiluvan haltija:

DOMES PHARMA
3 Rue André Citroën
63430 Pont-du-Château
Ranska

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:

PHARMASTER+
Z.I. de Krafft
67150 Erstein
Ranska

Paikalliset edustajat ja yhteystiedot epäillyistä haittatapahtumista ilmoittamista varten:

Lisätietoja tästä eläinlääkkeestä saa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta.

ORION PHARMA Eläinlääkkeet
PL 425, 20101 Turku
Puh: +358 10 4261